

ERASMUS + KA2 PROJECT: "Strengthening Capacities for Higher  
Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries - HEPMP"  
Project number: 585927-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (2017 – 3109 / 001 – 001)  
Univerzitet Crne Gore  
Medicinski fakultet u Podgorrici  
HEPMP projekat  
Kurs "Bol – značaj i liječenje"  
Podgorica, 16.11.2019.  
bsb  
Test za polaznike kursa

Poštovani,

Test je anoniman i cilj mu je da utvrdi koliko polaznici imaju predznanja o temi koju obrađuje. Takođe, namjera je i da se vidi da li su tokom kursa usvojena i neka nova znanja. Zato je potrebno da svaki učesnik upiše neku svoju šifru (slovnju, numeričku ili kombinovanu) i na ulaznom i na izlaznom testu. Tako ćemo moći da analiziramo učinak kursa i na grupnom i na individualnom planu. Zahvaljujemo na saradnji!

Šifra: \_\_\_\_\_

Pitanja

1. Koja tvrdnja u vezi NSAIL nije tačna (zaokružite jedan odgovor):
  - a) **Najuspješniji su za bol jačine 2-5**
  - b) Najuspješniji su za bol jačine 6-8
  - c) Mogu biti OTC i izdavati se na recept
  - d) Postoji rizik od GERD, krvarenja u GIT, hipertenzije i prekomjerne upotrebe
  - e) Značajna toksičnost povezana sa dugotrajnom upotrebom
2. Koje je trajno neželjeno dejstvo opioda :
  - a) glavobolja
  - b) **opstipacija**
  - c) tremor ruku
3. Neuropatski bol je uzrokovan:
  - a) Aktiviranjem nociceptora različitim štetnim noksama
  - b) **Lezijom ili oboljenjem somatozenzornog dijela nervnog sistema**
  - c) Lezijom ili oboljenjem perifernog nervnog sistema
4. Farmakološka terapija prvog reda u lečenju neuropatskog bola su:
  - a) Nesteroidni antiinflamatorni lekovi
  - b) Opioidi
  - c) **Antidepresivni i antikonvulzivni lekovi**
5. Uz odgovarajuće karakteristike bola za dijagnozu neuropatskog bola najznačajnije je:
  - a) **Prisustvo hiperalgezije i alodinije**
  - b) Uz bol, prisutni simptomi i znaci gubitka motornih funkcija
  - c) Uz bol, prisutni sniženi ili ugašeni refleksi

6. Pušači imaju (više od jednog tačnog odgovora):
- a) **Veću incidencu bola**
  - b) Manju incidencu bola
  - c) **Veći intenzitet bola**
  - d) Manji intenzitet bola
  - e) **Veću incidencu bolesti diskusa**
  - f) Manju incidencu bolesti diskusa.
7. Šta je potrebno razmotriti u terapiji bola kod starijih pacijenata?
- a) Godine pacijenta
  - b) **Farmakokinetške i farmakodinamske promjene kod starijih**
  - c) Komorbiditete
8. Koji je lijek izbora kod starijih osoba sa hroničnim blagim do umjerenim bolom?
- a) NSAIL
  - b) Opioidi
  - c) **Paracetamol**
  - d) Sve navedeno
9. Lijekovi prvog reda za liječenje bola kod dijabetesne neuropatije su:
- a) Tramadol
  - b) **Pregabalin i duloksetin**
  - c) Gabapentin i venlafaksin
  - d) Amitriptilin
  - e) Sve navedeno
10. Šta je cilj terapije ataka migrene?
- a) Da se osoba oslobodi bola
  - b) **Da se osoba oslobodi bola za dva sata i da se bol ne vrati u naredna 24 sata**
  - c) Da se pacijent oslobodi bola.
11. Na koji način je najbolje dati lijek kod ataka migrene?
- a) Oralno
  - b) Sublingvalno
  - c) **Parenteralno, rektalno ili nazalno (sprej)**
13. Navedite tačnu tvrdnju o neuro-humoralnom pristupu akupunktуре:
- a) periferni nervni sistem je presudan u posredovanju akupunkturne anelgezije
  - b) korelacija meridijan-korteks –organ
  - c) akupunktura stimuliše moždanu koru i nervni sistem
  - d) **sve navedene tvrdnje su tačne**
14. Navedite tačnu tvrdnju o neuro-humoralnom pristupu akupunktуре:
- a) periferni nervni sistem je presudan u posredovanju akupunkturne anelgezije
  - b) korelacija meridijan-korteks –organ
  - c) akupunktura stimuliše moždanu koru i nervni sistem
  - d) **sve navedene tvrdnje su tačne**

