

ОСНОВЕ ХОМЕОПАТИЈЕ И ХОМЕОПАТСКИ ПРИСТУП ЛЕЧЕЊУ БОЛА

Проф. др Снежана Цупара

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

ТЕРАПИЈА БОЛА,
25.01.2020.г,
КРАГУЈЕВАЦ

Project number: 585927-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (2017 – 3109 / 001 – 001)

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

- ✓ Samuel Hahnemann - рођен је 10.4.1755. год. у малом саксонском градићу Meissen-у.
 - ✓ Од детињства запажене његове интелектуалне способности и склоност за учење језика.
 - ✓ 1775. уписао медицинске студије у Лајпцигу.
 - ✓ Издржавао се превођењем и подучавајући стране језике.
- После две године студија, незадовољан наставом медицине одлази у Беч и показује посебну способност уочавања симптома и анализе клиничке слике.

Због тешког материјалног положаја прекида студије у Бечу три месеца пре завршетка.

Ради као лекар стажер, у аустријској провинцији Трансилваније, као породични лекар, библиотекар и учитељ гувернерове деце.

1779. год напушта Херманштадт (данас град Sibiu у Румунији) ради одбране дипломског рада на универзитету у Ерлангену под називом

« Преглед конвулзивних обољења » и стиче титулу доктора медицине.

- Разочаран је тадашњим начином практиковања медицине. Неуспешна терапија дифтерије његове ћерке.
- 1784. год прелази у Дрезден, одустаје од бављења медицинском праксом
- Бави се искључиво превођењем стручних књига са страних језика.
- Врло је цењен и ужива ауторитет стручног преводиоца, научника, хемичара и фармацеута, али најмање својих колега лекара.
- 1790. године – идеја о сличности ефеката и симптома и изводи експеримент на себи - кора кинина за симптоме маларије.

»Similia similibus curentur«

ХАНЕМАНОВА ДЕЛА

1810. г. - прво издање »Organon « - а

1811. г. - »Materia Medica Pura«

»Organon« - филозофија хомеопатије

»Materia Medica Pura« хомеопатска фармакологија и фармакопеја.

Издања »Organon«-а

1819.г. – друго, доста измењено издање

1824.г. – треће, мало измењено

1828.г. – четврто, доста измењено и под утицајем

„Хроничних болести“ које су изашле 1828 -1830.г.

1833.г. - пето издање

Рукопис шестог издања Ханеман је завршио 1842. г., али је он остао необјављен у моменту његове смрти 1843.г.

Термин алопатски настао је када и хомеопатија (почетком 19.века)

- ✓ увео га Ханеман, оснивач хомеопатије
- ✓ дефинише разлике између два приступа - етиологија речи *állos*, "другачији, различит", указује на третман леком „другачијим“ тј. који има супротно дејство од симптома болести од које је пацијент оболео (*Contraria contrariis curentur*)

Хомеопатски лекови могу да излече оне симптоме, које би тај лек на здравом пацијенту произвео (*similia similibus curentur*)

„Алопатија“ и „алопатски лек“ употребљавају се данас најчешће за конвенционалну медицину и конвенционални лек.

Принцип „супротности“ није једини који је заступљен у данашњој конвенционалној медицинској пракси

Израз „Алопатија“ се данас употребљава без негативне конотације, коју је историјски имао, када се односио на тадашњу конвенционалну медицину, називану често „херојском“, јер је упошљавала екстремно агресивне методе (пуштање крви, употребу пургатива, итд.).

Хомеопатско лечење захтева процену целокупног стања пацијента - холистички приступ

Како се пацијент генерално осећа на свим плановима:

- ✓ **Ментално**
- ✓ **Емотивно**
- ✓ **Физички**

Посологија - различита од конвенционалне медицине.

Индивидуализована терапија у посологији лека.

Дозирање и начин давања лека зависи од

➤ **карактеристика пацијента**

(стање организма, у којој мери је болешћу исцрпљен, на ком нивоу здравља се пацијент налазио пре почетка болести и у тренутку започињања третмана)

➤ **карактеристика болести**

(дужине трајања, интензитета, стадијума)

Хомеопатијом се лече хронична, вирусна, гастро-интестинална, јатрогена, кожна обољења, проблеми у понашању, као третман избора пацијента или помоћни третман у лечењу канцера.

Project number: 585927-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (2017 – 3109 / 001 – 001)

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

Основна правила у дозирању хомеопатског лека:

- 1. употребљава се док постоје симптоми**
- 2. са побољшањем смањити фреквенцију дозирања и обуставити терапију**

Proving-доказивање лека

Ради се на добровољцима и то је начин на који настаје Материја Медика и Реперторијум

Али може да се јави уколико се хомеопатски лек:

- предуго употребљава и након побољшања које је наступило или
- необазриво и често дозира или се користи без саветовања са лекаром или
- употребљава на сличан начин као алопатски лек

Тј. реакција доказивања (*proving*)

То је појава да лек изазове код пацијента оне симптоме које може да лечи.

Треба одмах прекинути употребу лека и ови симптоми ће нестати.




- Краткотрајно погоршање постојећих симптома је обично доказ добро одабраног лека за пацијента
- Пролази само од себе, у релативно кратком периоду времена, без даљег напредовања болести.
- Често бива праћено значајнијим побољшањем стања пацијента

**Краткотрајно погоршање постојећих симптома
НЕ ТРЕБА ЛЕЧИТИ АЛОПАТСКИ!**

РЕПЕРТОРИЈУМ И МАТЕРИЈА МЕДИКА



Хомеопатски реперторијум индексира у рубрици специфични симптом и СВЕ ЛЕКОВЕ КОЈИ ГА МОГУ ЛЕЧИТИ.

Materia Medica - скуп свих симптома који један лек лечи, а набројани редом по органима и системима органа.



Project number: 585927-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (2017 – 3109 / 001 – 001)

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"



Project number: 585927-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (2017 – 3109 / 001 – 001)

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

Лекови се наводе у рубрици официналним скраћеницама.

Степен интензитета којим тај лек утиче на одређени симптом означен је различитим стиловима фонта којим је написан у датој рубрици.

На пр.:

TEARS, **acid**: all-s, **Ars.**, bell., bry., *calc.*, *caust.*, cedr., clem., **Euphr.**, итд.

Respiration

Difficult – accompanied by

- perspiration: bapt ip
- prickling: lob
- salivation: increased: lob
- stool: loose: lycps-v
- ulcers: kali-n
- uremia (See GENE - Uremia - accompanied - respiration)
- urinary and heart complaints (See BLAD - Urinary - accompanied - heart)
- urine | albuminous (See URIN - Albuminous - accompanied - respiration)
- urticaria: apis
- vertigo: acon eur kali-c laur
- Brain congestion: cimic
- Chest:
 - catarrh (See CHES - Catarrh - accompanied - respiration)
 - constriction (See CHES - Constriction - accompanied - respiration)
 - oppression (See CHES - Oppression - respiration - difficult)
 - pain (See CHES - Pain - accompanied - respiration)
- Heart:
 - complaints of the heart (See CHES - Heart; complaints - accompanied - respiration)
 - dropsy (See CHES - Dropsy - cardiac - dyspnea)
 - pain in the heart (See CHES - Pain - heart - accompanied - respiration)
 - weakness of (See CHES - Weakness - heart - accompanied - respiration)
- Kidneys; inflammation of (See KIDN - Inflammation - accompanied - respiration)
- Lips:
 - cyanotic (See Complaints - accompanied - face - red discoloration of: spig)
- Lungs; cancer of the | Heart; weakness of (See CHES - Weakness - heart - accompanied - lungs - cancer - dyspnea)
- Nose; obstruction of (See NOSE - Obstruction - suffocating; NOSE - Obstruction - swelling)
- Ovary and heart complaints; pain in left (See FEMA - Pain - ovaries - accompanied - heart)
- Shoulders; raised: ant-c (non: eup-per)
- Stomach:
 - congestion: grin
 - pain: arg-n
- Testes; pain in: spong
- Throat; constriction in: bell cham coce dig dros Hyd-ac lob Mosch sabad
- air agg: draft of: lob
- air; in open:
 - agg: Borx caust crot-c phys plat Psor rhus-t sel seneg sulph
 - amel (Agg - open - doors; open - window): aeth alum Am-c am-ns Apis arg-n ars-i bapt bell Bry Cact calc cano-s carb-n chel Chinin-ar cist dig fl-ac Gels

Difficult – breathing

- air; in open: amel: ...
- psor Puls rhus-t stram Sulph tarent Tub
- alternating with:
 - convulsions: plat
 - metrorrhagia (See FEMA - Metrorrhagia - alternating - dyspnea)
 - sleep; deep: plb
 - slow respiration (See Slow - alternating - suffocation)
 - sopor: plb
 - urticaria: Calad
 - uterine hemorrhage: fl-ac
- Hypochondria; pain in: Zinc
- anger; after (See MIND - Anger - respiration)
- anxiety; from (See MIND - Anxiety - respiration; with)
- arms away from the body amel; holding the: lach
- air nux-v psor spig tarent
- ascending:
 - agg: aeth ac agn aloe Am-c ang Apis aral Arg-n Ars bar-c bar-i bar-m bar-s berb beryl Borx Brom bros-gau bufo Cact Calc Calc-ar calc-i calc-p calc-s calc-sil cann-i canth Caps Carb-ac carb-n cart castm chinin-ar cist Clem coe-c Coca crot-c cure dire Elaps ferr glon graph grat helx hyos iber Iod Ip kali-ar kali-c kali-n Kali-p led lil-t Lob Lye Lycps-v mag-m Merc nat-ar Nat-m Nat-s Nit-ac nux-v ol-an petr Pic-ac Plb puls ran-b rat rauw Rhus-t Ruta Sars Seneg sep spig Spong squil Stann sul-i sulph tab ter
- stairs | agg: iod
- athletics; in: coca
- autumn agg: chin
- beer; after: coce graph
- bending:
 - arms | backward agg: Sulph
 - backward:
 - agg: apis cupr psor Sulph
 - amel: cupr fl-ac
 - forward:
 - agg: apis seneg Spig
 - amel: Arg-n Ars Cench coe-c colch Kali-bi Kali-c Lach Spong
- head:
 - backward:
 - agg: bell cham hep
 - amel: spong
 - must rise up and bend head backward: hep
 - forward | amel: sep
- shoulders:
 - backward | amel: calc calc-act
- breakfast | amel: sulph
- breathing:
 - deep:
 - agg: phos thuj
 - amel: seneg sulph
 - last; as if the next would be the: apis

Difficult – breathing

- want of breath (See Arrested)
- chest muscles fail to act; as if: vib
- children; in: Ambr Ant-t calc cale-p Ip lyc med Nat-s Puls samb thuj
- newborns (Agg - Asphyxia - children): ant-t laur
- chill; during: ant-t Apis arg-n ars bry caps cimx con gels gins guare hep ign ip kali-c mag-p mezh Nat-m nux-m nux-v puls seneg sep stram Thuj zinc
- closing the eyes agg: ang carb-an Carb-v
- clothes:
 - loosening clothes (Agg - Impeded - pressure - clothes): amel (Agg - Impeded - pressure - clothes): aur-m Caust lach Nux-v stann Sulph
 - neckcloth amel; loosening: ham sars
 - coffee agg: Bell Cham dig digin
- colition:
 - after: ambr arund asaf Cedr Dig ph-ac Sep staph
 - during: aeth Ambr arund asaf con sep Staph
 - end of; towards: Staph
- cold:
 - air:
 - agg: Act-sp all-c alum apis aral Ars aur graph Lob Lye Merc nux-v petr puls sel seneg Spong sulph
 - amel: Am-c apis Arg-n bell Bry Carb-v Carb-n-s chim cist graph Kali-c kali-s lac-c lach Med Op Puls tub ust
 - cold; after taking a: acon ars arum-d Bell carb-v cham chin dule ip Kali-i lach med puls
 - coma; with (See MIND - Coma - respiration - difficult)
- constriction:
 - Diaphragm; of: cact
 - Larynx; of: Apis bell coce Crot-h dros hell Lach ox-ac sars spong
 - Stomach; of: guaj
 - Throat-pit; at: coce
 - Trachea; of: petr
 - contraction; from | Abdomen; in: bry nat-s
 - convulsions; during: glon Lyss nux-v Op stry tanac
 - tetanic: mill
- cough:
 - before: caust cor-t lyc
 - during | agg: alum am-c Ambr anac Apis Arn ars bell Bry carb-v caust cham Chin Cina coce Cupr dig Dros euph Euphr ferr guaj iod Ip kali-bi Kreos led lyc m-arct m-aust nat-m Nux-v ph-ac phos Puls rhod rhus-t sabad Samb seneg sep squil Stann sulph verat zinc
- covering nose or mouth (Agg - handkerchief): am-c Arg-n cupr Lach
- crowded room; in a: Arg-n lil-t
- darkness agg: aeth carb-v
- diarrhea, profuse: merc-sul
- dinner; after: chel nat-m Nux-v Puls sars
- diseased conditions of distant parts not involved in act of breathing: berb puls
- dreams:
 - after frightful: bapt Chel
 - during: agar sang zinc

Respiration

Difficult – expiration


- drinking:
- after | agg: Mur-ac nux-v thuj
- agg: anac apis Arg-n bell Cimx Kali-c kali-n lim meph nat-m plb squil thuj
- cold water:
 - agg | heated; when: Kali-c
 - amel: cham
 - difficult: squil
 - impossible: Kali-n
- dust; as from: Ars aur-m bell Brom Calc cycl Hep ip nux-v phos Sil sulph
- eating:
 - after | agg: allox Anac ant-ar ant-c apoc ars ars-s-f Asaf asc-t Aur bry calad calc carb-an Carb-v carb-n-s cham chel chin con dig digin kali-p Lach Mag-m med merc nat-m Nux-m Nux-v Phos Puls ran-b rhus-t sang sanc sars sol-t-ae Sulph syph viol-t Zinc zinc-p
 - amel: cedr Graph iod med Spong
 - overeating agg; after: Carb-v
 - while | agg: ant-ar cann-i kali-c mag-m
- edema, pulmonary; adon Am-c Carb-n-s Ferr-i
- effort, after (See Exertion - agg - slight)
- emissions agg; after: Phos Staph
- emphysema; in: am-c Ant-ar carb-v cortico cupr-ar ephe grin hist ip morg-p penic pneu psor queb sars seneg tub tub-r
- old people; in: naphthin
- eructations | amel: ambr ant-t Aur Carb-v Nux-v psor
- eruptions:
 - suppressed eruptions; after (Agg - Asthmatic - eruptions): Apis mez puls
 - with (Agg - Asthmatic - accompanied - eczema): Apis
- excitement agg (Agg - Hyperventilation): ambr ars caj Coc-c cupr ferr Puls Sep
- exertion (Agg - manual):
 - after | agg (Agg - manual): acetan am-c am-m ambr Apis aral Arg-n am Ars Ars-i ars-s-f asaf Aspidin Aur-m benz-ac beryl borx bov brom Calc calc-p Camph Carb-v carb-n-s Cencl chlf cimic cist Coca colch con conv crat Dig dire Ferr-m glon Iod Ip Kali-ar Kali-c Kali-i kali-sil kalm Lach Laur Led Lob Lye Lycps-v mag-s med Merc Nat-m Nat-s Nit-ac Nux-m Nux-v ox-ac ph-ac Phos Puls rat rauw rhus-t sars sel sep Sil Spig Spong squil Stann Staph sul-i Sulph ter tub Verat
 - agg:
 - slight exertion: calc coea crat laur Stann pulse; without much increase of: crat
 - arms agg; of: the: am-m bov Lach Nat-m Nit-ac Sil
- expectoration:
 - amel: ail Ant-t ars aur Grin guaj ip kali-bi manc nit-ac Sep Zinc
 - checked, after: Ant-t Sep
 - expiration: am-c anac Arg-mer ars brom Caust chin Chlor dros Ip Med Meph puls Samb seneg sep viol-o
 - cough, during: meph

Chest

Back

Cough

Materia Medica



"This pr

be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

ission cannot

ПРЕВОЂЕЊЕ СИМПТОМА ПАЦИЈЕНТА НА РЕЧНИК РЕПЕРТОРИЈУМА – ПРИМЕР СИМПТОМИ УМА

1. Пацијент је категоричан, изричан, одређен (тражи најпре преглед крви или одређене тестове)
2. Тврдоглав, својеглав, инсистирајући
3. Болесник се плаши да можда никад неће поново бити добро
4. Дете седи на крилу мајке све време и држи је за руку.
5. Болесник не може никада да дође сам, стално му треба помоћ
6. Болесник је осетљив на (људске) гласове
7. Болесник одговара кратко, отсечно (војнички)
8. Користи сирове речи, груб, псује
9. Непријатељски расположен, ироничан, прави шале на рачун околине (лекара)
10. Потцењује, омаловажава, болесник сумња у квалификацију (вредност) других људи
11. Емоционалан, или му топао приступ помаже у болести

Ум – позитивност (позитиван став)

Ум – тврдоглав, упоран

Ум – сумња – излечење, у

Ум – наслања се, качи се – хвата се за друге

Ум – ношен – жеља да га носе на рукама

Ум – сензитиван – бука, на – гласови, на

Ум – нагао

Ум – сировост, грубост

Ум – потсмева се

Ум – презрив, не мари за друге, ниподаштава их

Ум – тешење – побољшава

Виталан мушкарац 35 год, јак, здрав.

Жали се на јак, туп, убадајући и севајући бол бол у десном рамену.

Током два месеца и поред физикалне терапије, бол се поступно појачавао.

Сада не може да користи руку, пошто боли на сваки покрет.

Мишићи десног рамена полако атрофирају. Бол зрачи у десну руку, до испод лакта.

Бол се погоршава на хладно, на ветар, на влагу (купање) откривање, ноћу, и када лежи на десној страни.

Humero-skapularni periartritis?

Дијагноза у хомеопатском третману није
пресудна!

Може само да олакша сагледавање случаја

Project number: 585927-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (2017 – 3109 / 001 – 001)

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

СУШТИНА СЛУЧАЈА – по речима пацијента

1. SHOULDER
2. RIGHT ARM
3. WEAKNESS
- 4.< LYING RIGHT
- 5.< LYING PAINFULL SIDE
- 6.< NIGHT
- 7.< GETTING COLD
8. < GETTING WET
- 8.< IN WIND
- 9.< UNCOVERING

Project number: 585927-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (2017 – 3109 / 001 – 001)

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

ЛОКАЛИЗАЦИЈА:

Страна - десна

Рамене (бол у)

Рука, надлактица, бол у

СЕНЗАЦИЈЕ: Убадајући бол, слабост

МОДАЛИТЕТИ: <Покрет; <Ноћу; < Ветар

<Влага; <Хладноћа; <Откривање; < притисак ж

< лежање на болној страни

КОНКОМИТАНСИ: Емацијација, атрофија захваћеног дела.

РЕПЕРТОРИЗАЦИЈА – одабране рубрике

1. Pain Shoulder
2. Pain, upper arm
3. Side right
4. Pain stiching
5. Pain, paralytic
6. Weakness
7. Cold <
9. Wet <

9. Motion <
10. Night <
11. Wind <
12. Uncovering<
13. Lying on side, painfull <
14. Emaciation-atrophy off affected part

Project number: 585927-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (2017 – 3109 / 001 – 001)

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

Phosphorus CN 7 - 3 x дневно, 7 дана

После 3 недеље: бол мањи, може да лежи на десној страни што није било могуће

2 месеца: побољшање се наставља. Вежбање смањује атрофију мишића.

3 месеца: обе руке без бола. Трајно побољшање стања десне руке, обе руке без бола.

Project number: 585927-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (2017 – 3109 / 001 – 001)

Студенткиња 27 година.

Пре 4 недеље породила се царским резом под анестезијом.

Затим је примљена после 2 недеље поново у болницу јер се рана инфицирала.

Рана је онда ревидирана под анестезијом, а затим су дати антибиотици ради даљег лечења.

Због тога јој се млеко прекинуло, иако је раније имала нормално.

Она жели да поново доји дете и пита може ли се нешто учинити.

1. Narcotics aggr.
4. Inflammation, externally
3. Inflammation, internally
4. Quinine abuse of
5. Milk absent
6. Injuries, operation after.

Project number: 585927-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (2017 – 3109 / 001 – 001)

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

ТЕРАПИЈА

Них-воміса СН 30 - 1 гранула, 2 x дневно, 4 дана.
Ефекат блокаде млека прекинут кроз 2 дана.

Project number: 585927-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (2017 – 3109 / 001 – 001)

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

ТЕРАПИЈА БОЛА У ХОМЕОПАТИЈИ

Терапија болних стања у хомеопатији је по општем принципу хомеопатског лечења сваког обољења.

Одабир одговарајућег лека је на основу симптома пацијента.

Хомеопатски се оваква стања могу збрињавати употребом оног хомеопатског лека чија слика одговара симптомима пацијента.

КОЛИКЕ

- **Belladonna**

Болови почињу нагло и губе се нагло, интермитентно. Удружен бол уз акутни запаљенски процес. Погоршавање при покрету, савијању, потресању. Такође за болове у десном уху.

- **Colocynthis**

Колике које су олакшане притиском, топлотом, пресавијањем и скупљањем ногу. Склоност ка дијареји. Севајући ланцинантни болови који се периодично појављују.

- **Magnesium phosphoricum**

Побољшање од притиска, топлоте и пресавијања унапред. Затвор или спастичност током евакуације столице. Чупајући болови.

УБОЈИ, УДАРЦИ, КОНТУЗИЈЕ, ПАД СА ВЕЛИКЕ ВИСИНЕ

Код ових повреда је кожа обично цела, а формирају се крвни подливи, оток и бол под кожом.

Arnica (Arn)

- - после ударца, убоја, ударца ногом, шока, пада са висине, контузија;
- - повреда или велики напор уз осећај разбијености, исцрпљеност, слабост;
- - велики крвни подливи и дубоко постављени хематоми;
- - посебна осетљивост на додир;
- - пацијент раздражљив, који не жели помоћ;
- - склоност крвављењу; трауматски шок.

Bellis perennis (Bell-p)

- нарочито се након хируршких захвата - великих резова ткива нпр. абдоминалне операције. Може се уопотребљавати после Арнике код повреда као што су контузије, шок, ударац итд .
- - болови као да је све сломљено;
- - после шока, ударца, контузије, потреса са крвним хематомом;
- - после повреда мишића или услед мишићног претераног напора;
- - осетљивост на додир;
- - после контузије карлице или дојки;
- - тамни крвни подливи (венски) у зони повреде.

Project number: 585927-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (2017 – 3109 / 001 – 001)

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

УБОЈИ, УДАРЦИ, КОНТУЗИЈЕ, ПАД СА ВЕЛИКЕ ВИСИНЕ

Hypericum (Hyper)

Важно трауматско средство када је погођена нервна или мождана супстанца:

- - контузија мозга, посла пада, шока, ударца (после Arn);
- - после контузије (прикљештења) прстију руку и ногу;
- - после пада са велике висине, са компресијом кичмене мождине;
- - главобоља после несреће, падова;
- - контузија репне кости;
- - повреде живаца због компресије (стискања) нпр. јако стезање удова завојем.

Ruta (Ruta)

- Трауматско средство после ударца ногом у тибију или друге делове тела где су кости чврсто везане за кожу, под површином тела. Индикације:
- - коштани болови после ударца ногом у кости и надражај периоста;
- - мишићни болови као код контузије или пригњечења, после јаког напора;
- - горе од лежања на болној страни;
- - боље од покрета.

Project number: 585927-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (2017 – 3109 / 001 – 001)

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

ОПЕРАЦИЈА И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЈЕ

Употреба хомеопатских лекова за оперативна стања подразумева не само терапију бола већ обухвата све три фазе:

- 1. Премедикација пред операцију: употребом одговарајућег хомеопатског лека смањује се страх од ишчекивања и последице трауме;**
- 2. Одговарајући хомеопатски лек умањује ефекат анестезије, реза и трауматизације ткива;**
- 3. Примена хомеопатског лека после операције убрзава опоравак.**

Project number: 585927-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (2017 – 3109 / 001 – 001)

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

1. За премедикацију пред операцију се могу користити:

Gelsemium (Gels) - Идикован за прву фазу премедикација пред операцију услед:

- - било ког облика тегобе услед страха и/или ишчекивања
- - појава мале жеђи или њено одсуство
- - интолеранција топлоте
- - слабост и/или дрхтање

Argentum nitricum (Arg-n) -Идикован за прву фазу премедикација пред операцију услед:

- - тешкоће да се поднесе ишчекивање која индукује појаву психичких и/или физичких симптома
- - појаве дијареје услед страха при ишчекивању
- - за веома импулсивне, неуљудне болеснике
- - болесник има додатно и страх од висине
- - болесника карактерише нервозно, брзо, журно узимање јела
- - болесник има поремећену перцепцију времена и простора

Непосредно **пре операције** препоручљиво је дати
Арнику у очекивању трауме и губитка крви.

Arnica (Arn)

Пре сваке операције

Ruta (Ruta)

Пре операције на костима и зглобовима

3. У **постоперативној фази** најпре треба размотрити последице анестезије. Зато је потребно дати *Nux-vomica* као средство избора, после буђења из анестезије или ако су симптоми пацијента више слични *Orium*.

Nux vomica (Nux-v)

- За операције и последице анестезије, увече пред операцију у одсуству других тегоба или одмах после операције ако су се већ појавиле последице операције.

За даље лечење и пост оперативни ток, избор хомеопатског лека зависи од врсте и места операције, као и од појаве постоперативних проблема.

Често је препоручљиво:

- после чистог реза и за зарастање ране дати **Staphisagria** или **Bellis perennis**;
- код јаких болова **Hypericum**;
- код крвављења **Phosphorus** или **Bellis perennis**.